



Procedimento Operacional Padrão Alta do paciente

Emissão: 03/2024
Vigência: 2 anos

Página 1



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO ALTA DO PACIENTE

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves e Joseany Oliveira de Souza	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho e Barbara Menezes	03/2024

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. RESPONSABILIDADE	3
3. PROCEDIMENTO.....	3
4. INFORMAÇÕES IMPORTANTES CONFORME PROTOCOLOS.....	4
4.1. FOLFOX/ FOLFIRI/ FLOT/ EOF/ FOLFIRINOX.....	4
4.2. XELODA.....	4
4.3. PACIENTES COM PORTOCATH.....	5
4.4. GERAL A TODOS OS PACIENTES EM USO DE MEDICAÇÃO ORAL	5
4.5. GERAL A TODOS OS PACIENTES EM USO DE MEDICAÇÃO ENDOVENOSA/INJETÁVEIS.....	6
5. CONTROLE DE VERSÕES.....	6

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves e Joseany Oliveira de Souza	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho e Barbara Menezes	03/2024

1. OBJETIVO

Padronizar o processo de alta após término da assistência realizada nos ambulatórios (Quimioterapia EV e oral, injetáveis, hidratações, limpeza de cateter e outros) realizando orientações multiprofissionais conforme necessidade para clientes/pacientes e acompanhantes, permitindo a continuidade da assistência no domicílio.

2. RESPONSABILIDADE

Enfermagem
Equipe médica
Farmacêuticos

3. PROCEDIMENTO

- Após o término da quimioterapia e de medicações o paciente é será liberado pela enfermagem se estiver bem clinicamente;
- Se o paciente estiver em observação ou hidratando será liberado somente com a autorização médica;
- Será retirado o acesso vascular (periférico ou central);
- Será prestada orientação pela equipe de enfermagem e ou multiprofissional (se necessário) sobre os principais cuidados que devem ser tomados em domicílio, horários de funcionamento da unidade e como proceder em caso de urgência;
- Algumas orientações devem ser obrigatoriamente repassadas aos pacientes e acompanhantes conforme o protocolo de tratamento para continuidade da assistência em domicílio;
- As Orientações devem ser registradas no prontuário no paciente Tasy – PEP – ORIENTAÇÕES AO PACIENTE – SALVAR – IMPRIMIR – Entregar ou enviar por mensagem de WhatsApp uma via para o paciente e ou acompanhante.

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves e Joseany Oliveira de Souza	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho e Barbara Menezes	03/2024

4. INFORMAÇÕES IMPORTANTES CONFORME PROTOCOLOS

4.1. FOLFOX/ FOLFIRI/ FLOT/ EOF/ FOLFIRINOX

- Evitar atividades físicas durante o período que estiver com infusor;
- Evitar calor de fogo em uso do infusor;
- Não molhar o curativo durante os banhos;
- Cuidado ao deitar para não tracionar o cateter;
- Manter as pinças abertas;
- Manter proteção solar;
- Orientar o paciente como identificar o término da medicação (Régua)
- Informar a previsão de término do infusor;
- Fechar a pinça assim que identificar o término e se dirigir a Clínica;
- Entrar em contato com o celular da assistência, da coordenação (Noite) e ou médico assistente em caso de dúvidas ou sinais e sintomas diferentes dos habituais.

4.2. XELODA

- Boa higienização e hidratação com cremes emolientes. (Utilizar cremes hidratantes sem álcool, de uso infantil, 2x/dia, à base de alantoína e, se não disponível, recomenda-se o uso de loção oleosa com ácidos graxos essenciais (age) ou outro hidratante disponível;
- Usar luvas de algodão para proteger as mãos e luvas de borracha para tarefas domésticas;
- Utilizar sapatos confortáveis, meias de algodão grossas para proteção dos pés; considerar uso de palmilhas (redução das áreas de pressão);
- Evitar extremos de temperaturas e o uso de produtos que contenham álcool ou quaisquer agentes irritantes;
- Comunicar ao médico responsável quaisquer sinais e sintomas que venham ocorrer durante o tratamento;

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves e Joseany Oliveira de Souza	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho e Barbara Menezes	03/2024

- Orientar sobre risco de queda domiciliar;
- Não deixar o medicamento em locais que podem ultrapassar os 30°C como carros, locais que pegam sol diretamente e locais úmidos;
- Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros, por via oral, 30 minutos após o café da manhã e 30 minutos após o jantar. Ingerir os comprimidos com água;

4.3. PACIENTES COM PORTOCATH

- Comparecer a Clínica no máximo a cada 90 dias para realizar a limpeza e ou Heparinização do cateter quando o mesmo, não estiver em uso;
- Sempre que o cateter for utilizado há necessidade de realização da limpeza e ou heparinização;
- Durante o banho lavar o local da punção com água e sabão;
- Evitar pancadas no local da punção;
- Comunicar imediatamente o médico assistente e ou enfermagem em caso de desconforto, vermelhidão, secreção e dor;

4.4. GERAL A TODOS OS PACIENTES EM USO DE MEDICAÇÃO ORAL

- Não deixar o medicamento em locais que podem ultrapassar os 30°C como carros, locais que pegam sol diretamente e locais úmidos;
- Orientar quanto a importância da ingestão hídrica;
- Orientar quanto à importância da alimentação saudável;
- Estabelecer um horário único para tomar a medicação evitando o esquecimento;
- Utilizar conforme prescrição médica;
- Avisar a equipe assistencial via telefone ou mensagem de WhatsApp quando a medicação estiver acabando (faltar 10 comprimidos);
- Em caso de esquecimento não repor a dose e continuar conforme rotina;
- Não dirigir ou operar máquinas em caso de vertigens;
- Orientar sobre risco de queda domiciliar;

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves e Joseany Oliveira de Souza	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho e Barbara Menezes	03/2024

- Não suspender a medicação sem consentimento do médico assistente;
- Comunicar imediatamente o médico assistente efeitos indesejados não esperados com o uso da medicação;
- Orientar ao paciente que todos os medicamentos de uso concomitantes devem ser informados a farmácia clínica para análise de possíveis interações medicamentosas;

4.5. GERAL A TODOS OS PACIENTES EM USO DE MEDICAÇÃO ENDOVENOSA/INJETÁVEIS

- Orientar quanto à importância da ingestão hídrica;
- Orientar quanto à importância da alimentação saudável;
- Observação do local da punção ou administração de injetáveis;
- Na presença de nodulação local, fazer massagens e aplicar compressas frias;
- Comunicar imediatamente o médico assistente efeitos indesejados não esperados com o uso da medicação.

5. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Motivo	Data da Revisão
09/2019	Criação	09/2019
07/2022	Revisão - formatação	07/2022
03/2024	Revisão - formatação	03/2024

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves e Joseany Oliveira de Souza	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho e Barbara Menezes	03/2024