



CENTRO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA

Procedimento Operacional Padrão Cateterismo Vesical de Alívio

Emissão: 03/2024

Vigência: 2 anos

Página 1



CENTRO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. RESPONSABILIDADE.....	3
3. MATERIAL	3
4. PROCEDIMENTO.....	3
5. REFERÊNCIAS	6
6. CONTROLE DE VERSÕES	6

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

1. OBJETIVO

Esvaziar a bexiga por quadro de retenção urinária, colher amostra de exame e instilação intravesical.

2. RESPONSABILIDADE

Enfermeiro e auxílio de técnico de enfermagem no procedimento.

3. MATERIAL

- Luva de procedimento
- Máscara descartável
- Luva estéril
- Sonda uretral (Nº 08 e 10)
- Lidocaína geléia a 2%;
- Solução anti-séptica (Clorexidina degermante)
- SF 0,9% 100 ml
- Coletor de sistema aberto
- Recipiente para lixo
- Compressas de gazes

4. PROCEDIMENTO

Cateterismo Sexo Feminino

- Explicar o procedimento ao paciente;
- Levar o material ao leito do paciente;
- Calças luvas de procedimento;
- Colocar a paciente em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados, e os pés apoiados sobre a cama e as pernas afastadas;
- Realizar a limpeza íntima com clorexidina degermante e lavar com SF0, 9%, utilizando luvas de procedimento;
- Retirar as luvas de procedimento e lavar as mãos, conforme Higienização das mãos;
- Colocar o saco de lixo próximo a cama;

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

- Calçar as luvas estéreis;
- Abrir sobre o campo de luva estéril os materiais (gazes, sonda vesical) com ajuda de outro profissional de enfermagem sobre a mesa de mayo;
- Afastar os grandes e pequenos lábios com os dedos indicadores e polegar da mão esquerda e expor o vestibulo vaginal e meato da uretra, permanecendo nessa posição até o final da técnica;
- Com a mão direita fazer uma anti-sepsia do períneo. A anti-sepsia deverá ser obrigatoriamente no sentido púbis-ânus, na seqüência: grandes lábios, pequenos lábios, uretra; usar uma vez uma gaze montada para cada região acima e desprezá-la;
- Grandes e pequenos lábios D e E no sentido ântero-posterior e de cima para baixo;
- Continuar expondo o meato uretral e com a mão direita, inserir a sonda lubrificada com lidocaína geléia a 2% cerca de 3 a 4 cm após o refluxo da urina;
- Realizar o esvaziamento da bexiga totalmente ou coletar a urina caso seja para exame laboratorial;
- Remover a sonda suavemente, quando a urina parar de fluir;
- Secar a área, deixar o paciente confortável;
- Retirar as luvas e lavar as mãos;
- Recolher todo o material;
- Fazer anotações de enfermagem.

Cateterismo Vesical Masculino

- Explicar o procedimento ao paciente;
- Realizar higiene íntima;
- Lavar as mãos;
- Levar o material ao leito do paciente;
- Colocar o paciente em decúbito dorsal com as pernas afastadas, calçar as luvas de procedimento;
- Fazer a higiene íntima com água e sabão;
- Retirar as luvas de procedimento e lavar as mãos;
- Colocar o saco de lixo próximo à cama;

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

- Abrir o pacote de cateterismo vesical com técnica asséptica sobre a mesa de mayo;
- Colocar sobre o campo a sonda vesical e gaze;
- Calçar as luvas estéreis;
- Segurar o pênis com uma gaze, retraindo o prepúcio com o polegar e indicador (mão esquerda). Essa mão deve permanecer imóvel no local até o término do procedimento;
- Fazer a anti-sepsia obrigatoriamente no sentido do meato uretral para a periferia (glândula, prepúcio e corpo do pênis) utilizando gazes embebidas na solução anti-séptica;
- Introduzir a lidocaína geléia 2 % no meato, pressionando a extremidade do mesmo contra o bico da seringa.
- Manter pressionada a glândula por cerca de 2 minutos para evitar refluxo da geléia;
- Com a mão direita inserir suavemente a sonda até sua bifurcação (18 a 20 cm) com movimentos para baixo, com o pênis elevado perpendicularmente, e baixar o pênis lentamente para facilitar a passagem na uretra bulbar;
- Realizar o esvaziamento da bexiga totalmente ou coletar a urina caso seja para exame laboratorial;
- Remover a sonda suavemente, quando a urina parar de fluir;
- Secar a área, deixar o paciente confortável;
- Recobrir a glândula com o prepúcio a fim de evitar edema da glândula;
- Retirar as luvas;
- Recolher o material;
- Retirar as luvas e lavar as mãos;
- Fazer as anotações de enfermagem.

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024

5. REFERÊNCIAS

Mozachi, N. O hospital: Manual do ambiente hospitalar. 3ed. Curitiba. Os Autores. 2009.

Lenz, L.L. Cateterismo vesical: cuidados, complicações e medidas preventivas. Arquivos Catarinenses de Medicina. Volume 25, nº1, de 2006. Disponível em: <http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/361.pdf>. Acessado em 08/05/13.

6. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Motivo	Data da Revisão
09/2019	Criação	09/2019
01/2022	Revisão - formatação	01/2022
03/2024	Revisão - formatação	03/2024

	Nome	Data
Elaborado por:	Andrea Melo Ribeiro de Pádua Alves	03/2024
Aprovado por:	Luis Onofre Rezende de Carvalho	03/2024